ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ И ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПНЕВМОНИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Т. В. Смелая¹, Л. Е. Сальникова², В. В. Мороз¹, А. М. Голубев¹,
Ю. В. Заржецкий¹, А. В. Рубанович²

¹ НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского РАМН, Москва

² Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Москва

Genetic Polymorphism and the Rate of Development of Complications in Pneumonia of Varying Genesis

T. V. Smelaya¹, L. Ye. Salnikova², V. V. Moroz¹, A. M. Golubev¹, Yu. V. Zarzhetsky¹, A. V. Rubanovich²

¹ V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

² N. I. Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow

Цель работы — исследование генетического полиморфизма генов первой и второй фаз детоксикации ксенобиотиков (*GSTM1*, *GSTP1*, *GSTT1*, *CYP1A1*), а также *ACE*, *CCR5*, *MTHFR*, генов цитокинов *IL-6* и *TNF-α* для выявления наследственной предрасположенности к возникновению пневмонии различного генеза и осложнений при ней. **Материал и методы.** Изучены частоты встречаемости аллельных вариантов семи генов в группах больных (524) пневмонией и здоровых доноров (178 — группа контроля). **Результаты.** Выявлены генотипы, ассоциированные с предрасположенностью к возникновению внебольничной и нозокомиальной пневмонии: *GSTM1* I/*, *CYP1A1* 606T/T, *ACE* D/D, а также с повышенным риском развития осложненного течения внебольничной пневмонии (ВП). Зарегистрированы эффекты по аллельным вариантам гена *ACE* при развитии таких осложнений, как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), полиорганная недостаточность (ПОН) и сепсис: гомозиготы по inserции *ACE* I/I, сопряженные с выживаемостью, альтернативный генотип *ACE* D/D — с летальностью. **Заключение.** В результате проведенного исследования выявлена взаимосвязь полиморфизма генов детоксикации с предрасположенностью к развитию ВП и НП, возникновению осложнений при ВП. **Ключевые слова:** гены детоксикации ксенобиотиков, ключевого гена ренин-ангиотензиновой системы *ACE*, гена хемокинового рецептора 5 *CCR5*, пневмония, ОРДС, сепсис, ПОН.

Objective: to study the genetic polymorphism of the genes of phase I and II xenobiotic detoxification (*GSTM1*, *GSTP1*, *GSTT1*, *CYP1A1*), as well as *ACE*, *CCR5*, *MTHFR*, and those of the cytokines *IL-6* and *TNF-α* to reveal hereditary predisposition to pneumonia of varying genesis and its complications. **Materials and methods.** The frequency of the allele variants of 7 genes was studied in the groups of patients with pneumonia ($n=524$) and healthy donors (a control group ($n=178$)). **Results.** There were are genotypes associated with predisposition to community-acquired and nosocomial pneumonia (CAP and NP): *GSTM1* I*, *CYP1A1* 606T/T, *ACE* D/D and those associated with a higher risk for complicated CAP. There were effects of the allelic variants of the *ACE* gene in developing complications, such as acute respiratory distress syndrome, multiple organ dysfunction, and sepsis: *ACE* I/I insertion homozygotes linked to survival and the alternative *ACE* D/D genotype to mortality. **Conclusion:** The study revealed an association of detoxification gene polymorphism with predisposition to CAP and NP and with the development of complications in CAP. **Key words:** xenobiotic detoxification genes, key *ACE* renin-angiotensin system gene, chemokine receptor 5 (*CCR5*) gene, pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, multiple organ dysfunction.

Развитие молекулярно-генетических методов и технологий в последние десятилетия позволило картировать гены многочисленных наследственных болезней и идентифицировать мутации генов, появление которых приводит к нарушению функционирования кодируемого геном белка и развитию заболевания. Эти знания сейчас с успехом применяют на практике с целью ДНК-диагностики наследственных болезней, а в последнее время и с целью определения относительного риска подверженности индивидов многофакторным за-

болеваниям [1]. В настоящее время цитогенетические методы исследования для диагностики болезней органов дыхания направлены, в первую очередь, на выявление злокачественных новообразований, что продиктовано наличием высокого уровня хромосомного дисбаланса, сопровождающего развитие опухолевого процесса [2, 3]. В то же время высокая частота инфекционных заболеваний органов дыхания, не снижающаяся летальность при них, являются веским аргументом для проведения генетических исследований у больных пневмонией, которая относится к многофакторным заболеваниями.

Цель исследования — изучить роль функционального полиморфизма генов первой и второй фаз детоксикации ксенобиотиков, а также генов *ACE*, *CCR5*,

Адрес для корреспонденции (Correspondence to):

Смелая Тамара Валерьевна
E-mail: tamara_smelaya@mail.ru

MTHFR, *IL-6* и *TNF-α* в предрасположенности к возникновению пневмонии различного генеза и развитию осложнений.

Материал и методы

Проведено исследование генетического полиморфизма у 524-х больных, находившихся на лечении в ГВКГ МВД РФ и ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. Были выделены следующие группы: группа I — 277 больных внебольничной пневмонией (ВП), среди которых зарегистрированы 193 случая осложненного течения пневмонии (группа ВП-осл);

группу II составили 247 пациентов с различными заболеваниями и травмами («перитонит», «тяжелая сочетанная травма» и др.). В зависимости от особенностей течения основного заболевания были выделены две подгруппы:

IIA — 158 больных и пострадавших, у которых развилась нозокомиальная пневмония (НП);

IIБ — 89 пациентов с аналогичными заболеваниями, что и во IIA подгруппе, но у которых не развилась НП.

Группу контроля составили 178 здоровых доноров, ранее не болевших пневмонией.

От всех больных (или родственников) и здоровых лиц было получено информированное согласие на участие в генетическом исследовании. Характеристика больных с установленными генотипами представлена в табл. 1.

В каждой группе были выделены подгруппы в зависимости от исхода основного заболевания: «выжившие», «умершие».

Диагноз пневмонии устанавливали на основании бактериологических, клинико-рентгенологических и лабораторных данных. Тяжесть пневмонии оценивали с помощью шкалы Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) [4]. Всем больным проводили комплексную интенсивную терапию, согласно основной нозологии и развившихся осложнений. Временной диапазон пребывания больных в стационаре, отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) указан в табл. 1.

Всем больным и здоровым донорам было проведено выделение ДНК и генотипирование методом аллель-специфической гибридизации по ранее описанной методике [5]. Исследованы гены первой и второй фазы детоксикации (*GSTM1*, *GSTT1*, *GSTP1*), три сайта гена *CYP1A1* (*CYP1A1T606G*, *CYP1A1T3801C* и *CYP1A1A4889G*), а также ген *MTHFR*, ключевой ген ренин-ангиотензиновой системы *ACE*, ген хемокинового рецептора 5 *CCR5*, гены цитокинов *IL-6* и *TNF-α*. Праймеры подбирали с использованием программы Primer3, находящейся в открытом доступе [6]. Амплификацию выполняли в амплификаторах Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700.

В случае делеционно-инсерционного полиморфизма (*GSTM1*, *GSTT1*) выявлялись два генотипа: «нулевой» — гомозигота по делеции (D/D) и «положительный», несущий функциональный аллель в гомо- или гетерозиготном состоянии (I/*), где * — произвольный аллель. Генотипирование инсерционно-делеционного полиморфизма по локусам *ACE* (делеция 287 п. о.) и *CCR5* (делеция 32 п. о.) осуществляли мультиплексной ПЦР.

Степень ассоциации генотипов с заболеваниями охарактеризована показателем OR (odd ratio — отношение рисков, мера коррелятивной связи), равного:

$$OR = \{P_{\text{бол}}(1-P_{\text{здор}})\} / \{P_{\text{здор}}(1-P_{\text{бол}})\},$$

где $P_{\text{бол}}$ — частота генотипа среди больных, $P_{\text{здор}}$ — частота генотипа среди здоровых.

- $OR=1$ — указывает на отсутствие корреляций между генотипом и заболеванием.
- $OR>1$ — означает повышенный риск заболевания при данном генотипе.

Для проверки статистической значимости различий частот использовался двусторонний точный критерий Фишера. В ряде случаев для оценки достоверности различий частот использовался также трендовый тест Армитажа [7]. Частоты гаплотипов и их эффектов оценивали с помощью общедоступной on-line программы SNPStats [8].

Результаты и обсуждение

1. Значение полиморфизма исследованных генов на предрасположенность к возникновению пневмонии различного генеза.

Исследование пациентов с пневмонией и группы здоровых доноров показало, что для больных с аллельными вариантами трех генов детоксикации (*CYP1A1*, *GSTM1*, *GSTP1*) и гена ангиотензин-превращающего фермента *ACE* характерна более высокая частота развития пневмонии. В ранее опубликованной работе [9] представлены результаты исследования по выявлению генотипов предрасположенности к возникновению ВП. Дальнейшее изучение полиморфизма выше указанных генов в группах больных и здоровых добровольцев на увеличенной выборке подтвердило предыдущие результаты и выявило различия по частоте встречаемости генотипов изученных локусов не только в отношении внебольничной, но и в случаях нозокомиальной пневмонии.

Таблица 1

Характеристика больных в исследованных группах

Показатель	Значения показателей в группах		
	I (ВП), n=277	IIA (с НП), n=158	IIБ (без НП), n=89
Возраст, годы ($M \pm \sigma$)	25,29±8,01 (от 18 до 75)	42,43±17,23 (от 18 до 75)	43,70±17,69 (от 19 до 75)
Пол: мужчины/женщины, абс. знач./%	265 (95,67)/12 (4,3)	128 (81,01)/30 (18,99)	78 (87,64)/21 (12,36)
Продолжительность основного заболевания на момент поступления в госпиталь, сут ($M \pm \sigma$)	8,19±5,69 (от 3 до 21)	10,14±8,04 (от 1 до 65)	4,7±4,41 (от 1 до 21)
Тяжесть пневмонии, шкала CPIS, баллы ($M \pm \sigma$)	8,79±1,02 (от 6 до 12)	8,38±1,62 (от 6 до 10)	—
Тяжесть состояния при поступлении, шкала APACHE II, баллы ($M \pm \sigma$)	11,2±1,1 (от 8 до 21)	14,2±3,1 (от 11 до 23)	14,81±4,93 (от 11 до 23)
Длительность госпитализации, сутки ($M \pm \sigma$)	28,70±3,05 (от 24 до 128)	72,43±45,50 (от 6 до 323)	41,75±15,14 (от 26 до 235)
Длительность ОРИТ, сутки ($M \pm \sigma$)	3,70±1,01 (от 1 до 51)	24,29±17,58 (от 3 до 318)	5,10±2,64 (от 2 до 19)
Летальность, абс. знач./%	9 (3,25)	67 (42,41)	2 (2,25)

Таблица 2

Гены, ассоциированные с предрасположенностью к развитию пневмонии

Локусы	Генотипы	Значения показателей в группах, абс. знач. (%)			
		Контроль, n=178	I (ВП), n=277	ПА (с НП), n=158	ПВ (без НП), n=89
<i>CYP1A1 606</i>	T/T	76 (42,72)	134 (55,1) [#]	0 (0,00)	0 (0,00)
	T/G	74 (41,6)	81 (33,3)	143 (91,08)	81 (90,00)
	G/G	28(15,7)	28 (11,5)	14 (8,92)	9 (10,00)
<i>ACE</i>	D/D	40 (22,5)	82 (33,7) ^{##}	0 (0,00)	0 (0,00)
	D/I	89 (50,0)	103 (42,4)	72 (45,86)	42 (47,19)
	I/I	49 (27,5)	58 (23,9)	85 (54,14)	47 (52,81)
<i>GSTM1</i>	D/D	92 (51,7)	94 (38,7)	88 (55,70)	54 (60,67)
	I/*	86 (48,3)	149 (61,3) [#]	17 (10,76)	3 (3,37)
<i>GSTP1</i>	A/A	78 (44,1)	45 (48,4)	6 (9,68)	3 (7,89)
	A/G	87 (49,1)	45 (48,4)	41 (25,95)	22 (25,00)
	G/G	12 (6,8)	3 (3,2)	78 (49,37) [#]	39 (44,32)

Примечание. Полуожирным отмечены генотипы, ассоциированные с внебольничной пневмонией; подчеркнуты — генотипы, ассоциированные с нозокомиальной пневмонией. [#] — $p \leq 0,05$ — относительно контрольной группы; ^{##} — $p \leq 0,01$ — контрольной группы.

Таблица 3

Частота встречаемости генотипов предрасположенности к ВП и их комбинаций в группах контроля и больных внебольничной пневмонией

Генотипы	Значения показателей в группах, абс. знач. (%)		
	Контроль, не заболели ВП, n=134	ВП, n=277	Контроль, заболели ВП, n=44
<i>CYP1A1 606</i> T/T	46 (34,33)	134 (55,1) [#]	30 (68,18) [#]
<i>ACE</i> D/D	28(20,90)	82 (32,7) [#]	11 (25,0)
<i>GSTM1</i> I/*	61 (45,52)	149 (61,3) [#]	24 (54,55) [#]
<i>GSTM1</i> I/* — <i>ACE</i> D/D	11 (8,20)	58 (20,94) [#]	3 (6,82)
<i>GSTM1</i> I/* — <i>CYP1A1 606</i> T/T	20 (14,93)	77 (27,80) [#]	15 (34,09) ^{##}
<i>ACE</i> D/D — <i>CYP1A1 606</i> T/T	8 (5,97)	40 (14,14) ^{##}	5 (11,36) [#]

Примечание. *CYP 606* — сокращенное обозначение полиморфного сайта *CYP1A1* T606G. [#] — $p \leq 0,05$ — относительно контрольной популяции, не заболевшей пневмонией; ^{##} — $p \leq 0,01$ — относительно контрольной популяции, не заболевшей пневмонией.

Проведенный анализ частот однолокусных генотипов в исследованных группах показал, что повышенную предрасположенность к ВП обнаруживают гомозиготы по делеции в локусе *ACE* D/D ($OR=1,97$; $p=0,002$), «положительные» генотипы локуса *GSTM1* I/* ($OR=1,65$; $p=0,012$) и гомозиготы по аллелю 606T гена *CYP1A1* ($OR=1,6$; $p=0,016$) (табл. 2). Косвенным подтверждением этих наблюдений является сильное нарушение распределения Харди-Вайнберга (дефицит гетерозигот, $p < 10^{-6}$) в группе больных для локуса *CYP1A1* T606G (и только для них). В контрольной популяции все изученные локусы находились в состоянии равновесия по Харди-Вайнбергу. Для двух локусов зарегистрирован эффект дозы гена: в группах больных пневмонией и здоровых доноров достоверно отличаются частоты встречаемости аллелей 606T/T и 606G/G гена *CYP1A1* ($p=0,049$, $OR=1,34$), а также частоты делеционных и инсерционных аллелей гена *ACE* ($p=0,017$, $OR=1,39$).

Во второй группе у 158-и (из 247-и) больных и пострадавших развилась нозокомиальная пневмония (НП), что составило 53,97%. Ассоциации между генотипами и предрасположенностью к возникновению НП зарегистрированы только по локусу *GSTP1* (табл. 2). Результаты значимы относительно популяционного контроля и «отрицательного» контроля (группа ПВ).

Достоверность отличий по частотам аллелей у пациентов с нозокомиальной пневмонией в сравнении с популяционным контролем составляет по тесту Армитажа $p=0,03$, причем имеет место аддитивный эффект (зависимость от дозы гена). По двустороннему критерию Фишера эффект наблюдается на уровне тенденции по доминантной модели ($p=0,05$, $OR=1,55$). При сопоставлении частот аллельных вариантов по тесту Фишера в подгруппах ПА и ПВ различия достоверны по рецессивной модели ($p=0,05$, $OR=3,42$).

В результате сравнительного анализа из контрольной популяции была выделена группа риска, которую составили 137 человек (76,9%), имеющих один из генотипов предрасположенности или их комбинации (табл. 3). Гомозиготы по аллелю 606T/T гена *CYP1A1* составили 75 случаев (54,74%); гомозиготы по делеции в локусе *ACE* D/D — 35 (25,55%), «положительные» генотипы локуса *GSTM1* I/* — 84 случая (61,31%). Комбинация двух генотипов *CYP1A1* 606T/T — *GSTM1* I/* выявлена у 36-и человек (26,28%), а у 7-и — зарегистрировано сочетание всех трех генотипов предрасположенности (5,11%).

В течение трехлетнего периода наблюдений в госпиталь из контрольной группы (178 доноров) с предварительным диагнозом «острая внебольничная пневмония»

Таблица 4

Частота встречаемости протективных генотипов в исследованных группах

Локус, генотип	Значения показателей в группах, абс. знач. (%)				
	Контроль, не заболели ВП, n=134	К-ВП, n=44	ВП, n=277	ПА, n=158	ПВ, n=89
CYP1A1 606T/G	63 (47,01)	11 (25,0)##	81 (33,3)	14 (8,92)*	48 (53,93)
CYP1A1 606G/G	25 (18,66)	3 (6,82)#	28 (11,5)	70 (44,59)*	10 (11,24)
GSTM1 D/D - CYP1A1 606G/G	14 (10,45)	2 (4,55)	11 (3,97)	4 (2,53)*	8 (8,99)
GSTM1 D/D - CYP1A1 606T/G	33 (24,63)	5 (11,36)#	33 (11,91)#	8 (5,06)*	19 (21,35)

Примечание. # — $p < 0,05$ — относительно контрольной популяции, не заболевшей пневмонией; ## — $p < 0,01$ — относительно контрольной популяции, не заболевшей пневмонией; * — $p < 0,01$ — внутригрупповое сравнение (при сравнении ПА и ПВ).

Рис. 1. Частота протективных генотипов в группах с пневмонией (группа ВП + группа К-ВП + группа ПА, $n=479$) и без пневмонии ($n=223$).

поступили 47 человек. После детального обследования диагноз пневмонии был верифицирован в 44-х случаях, в двух — острый бронхит, в одном — диагностирован очаговый туберкулез легких. Среди 44-х заболевших (группа К-ВП) 39 человек (88,64%) из группы риска, т. е. имеют генотипы предрасположенности.

По частоте встречаемости генотипы предрасположенности в группе К-ВП распределились следующим образом: CYP1A1 606T/T — 74,36%; GSTM1 I/* — 61,54%; ACE D/D — 34,38%. Причем, в 20-и случаях (из 44-х) было отмечено наличие двух генотипов у одного и того же индивида, а в 3-х случаях зарегистрировано присутствие трех выявленных генотипов предрасположенности.

Анализ частот генотипов у заболевших из группы контроля (К-ВП) выявил высокую степень сопряженности мажорного варианта гена CYP1A1 с риском развития ВП, различия достоверны по отношению к общему контролю ($p=0,0013$ по трендовому тесту Армитажа). Этот факт является независимым подтверждением ассоциации аллеля 606T гена CYP1A1 с риском развития внебольничной пневмонии.

В ходе исследования было выявлено, что в ряде случаев однолокусные эффекты усиливались при рассмотрении комбинаций локусов. С этой точки зрения предрасположенности к возникновению ВП наиболее значимой оказалась комбинация локусов GSTM1 I/* — CYP1A1 606T (OR=1,9 при $p=0,006$). В группе К-ВП

данная комбинация выявлена у 14-и пациентов, что составило 31,82% от всей группы и 70,0% среди других вариантов сочетаний генотипов.

В то же время, альтернативный генотип CYP1A1 606G/* в гомо- или гетерозиготном варианте достоверно чаще встречался у здоровых доноров (OR=0,50 при $p=0,003$), что трактовали как протективный эффект. Совокупность соответствующих результатов представлена в табл. 3, 4 и рис. 1.

Представленные данные свидетельствуют (табл. 4, рис. 1), что генотипы протективной направленности GSTM1 D/D, CYP1A1 606T/G встречаются в группах без пневмонии достоверно чаще ($p < 0,001$), чем в случаях развития пневмонии различного генеза. Необходимо отметить, что протективный эффект генотипа 606G/G гена CYP1A1 в гомозиготном варианте проявился лишь в случаях внебольничной пневмонии (OR=0,50 при $p=0,001$), тогда как гетерозиготный вариант 606T/G встречается достоверно реже как при внебольничной, так и при нозокомиальной пневмонии (OR=0,50 при $p=0,003$). Еще более значителен этот эффект у носителей комбинации генотипов: GSTM1 D/D — CYP1A1 606G/G; GSTM1 D/D — CYP1A1 606T/G; GSTM1 D/D — CYP1A1 606G/G — CYP1A1 606T/G ($p < 0,001$).

Наиболее показателен этот результат для ПВ группы, где были раненые и пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами, а также больные с различными воспалительными заболеваниями, которые при поступлении имели интрапульмональные осложнения (гидроторакс, травматический пневмо- и/или гемоторакс, травматический пульмонит, ОПЛ), но в дальнейшем нозокомиальная пневмония у них не развилась. Носителей протективных генотипов в этой группе было 65,17%, в том числе, сочетаний — 30,34%.

2. Ассоциация выявленных генотипов генов 1-й и 2-й фаз детоксикации ксенобиотиков и гена ACE с осложненным течением пневмонии.

В ходе исследования у пациентов первой и второй групп были зарегистрированы различные осложнения течения основного заболевания. В группе I — 193 случая (ВП-осл), что составило 69,68%. Результаты сравнительного анализа свидетельствуют, что при внебольничной пневмонии аллельные варианты трех генов статистически достоверно ассоциированы с развитием

**Встречаемость различных вариантов генотипов по гену *ACE*
в случаях развития тяжелых осложнений (ОРДС, ПОН, сепсис) в исследованных группах**

Общее количество больных Число осложнений	Значения показателей в группах					
	ВП-осл (<i>n</i> =193)		ПА (<i>n</i> =158)		ПВ (<i>n</i> =89)	
	<i>n</i> =19		<i>n</i> =134		<i>n</i> =34	
ACE I/I	3 (37,5)	2 (18,18)	27 (47,37)	11 (14,28)##	24 (80,0)	4 (100,0)
ACE I/D	4 (50,0)	2 (18,18)	25 (43,86)	25 (32,47)	4 (13,33)	0 (0,0)
ACE D/D	1 (22,5)	7 (77,78)#	5 (8,77)	41 (53,25)##	2 (6,67)	0 (0,0)
Исход	в=8 у=11		в=57 у=77		в=30 у=4	

Примечание. Используемые в таблице «в» и «у» — сокращенное обозначение исхода основного заболевания (выжившие/умершие). # — $p < 0,05$ — по сравнению с «выжившими»; ## — $p < 0,01$ — по сравнению с «выжившими».

осложнений: *GSTM1* I/* ($p=0,045$, OR=1,4), *CYP1A1* 606T/T ($p=0,017$, OR=1,62) и *ACE* D/D ($p=0,048$, OR=1,7).

Для пациентов группы ПА нозокомиальная пневмония уже является осложнением, и риск ее развития ассоциирован с геном *GSTP1* (табл. 1). Необходимо отметить, что во всех случаях развития НП состояние больных и пострадавших ухудшалось. Так, если при поступлении в ОРИТ в подгруппах ПА и ПВ тяжесть состояния по шкале АРАСНЕ II существенно не отличалась, составив, соответственно, $14,26 \pm 3,13$ и $14,81 \pm 4,93$ баллов, то уже на 7-е сутки госпитализации в подгруппе ПА, где у 137-и пациентов развилась НП, тяжесть состояния составила $21,7 \pm 2,91$ баллов, тогда как в подгруппе ПВ — $14,17 \pm 3,11$ баллов.

На рис. 2 показана сравнительная частота развития осложнений в группах с внебольничной и нозокомиальной пневмонией. В группе ВП-осл (193 больных) чаще всего регистрировались инфекционно-токсический шок (ИТШ) — 59,07%, плеврит — 50,78% и токсический миокардит — 13,47%, а в 16-и случаях они сочетались у одного и того же больного; абсцесс легкого, эмпиема плевры составили — 7,25%, ПОН — 1,55%, сепсис — 0,5%. Обращает на себя внимание большая частота развития ОРДС среди больных ВП — 5,70% и некардиогенного отека легких — 1,55%.

Во второй группе частота развития ОРДС, ПОН и сепсиса была значительно выше, что обусловлено основной нозологией (тяжелая сочетанная травма, минно-взрывные ранения, гнойно-воспалительные заболевания различной локализации). При сравнении в подгруппе ПВ (без НП) тяжелые осложнения развивались реже, чем в подгруппе ПА. В подгруппе без НП в 13% случаев развился ОРДС, включая ОПЛ, тогда как в группе с НП — 36,7%; ПОН — 3,0% против 29,8%; сепсис — 1,0% против 15,8%, соответственно (рис. 2).

Проведенное исследование не выявило статистически значимых различий в частоте встречаемости локусов исследованных генов в зависимости от вида развившегося осложнения или исхода основного заболевания.

Однако исследование групп больных показало, что среди тех, у кого развитие тяжелых осложнений (ОРДС, ПОН и сепсис) не привело к фатальному исходу, частота встречаемости ACE I/* в гомозиготном или гетерозиготном вариантах была достоверно выше

Рис. 2. Развившиеся осложнения у больных в исследованных группах.

По оси абсцисс — частота осложнений, %.

($p \leq 0,01$). Соответствующие результаты представлены в таблице и на рисунке (табл. 5, рис. 2).

В группе ВП-осл тяжелые осложнения (ОРДС, сепсис, ПОН) развились в 19-и случаях (9,84%), выжили менее половины из них — 8 пациентов (42,11%). В группе ПА у 134-х больных (69,43%) зарегистрированы данные осложнения, благоприятный исход был в 57-и случаях (42,54%).

Известно, что ферменты детоксикации ксенобиотиков обеспечивают общую устойчивость организма к факторам внешней и внутренней среды, поэтому необходим баланс в работе ферментов обеих фаз для эффективной детоксикации [10, 11]. Среди изученных нами генов разнонаправленный характер аллельных вариантов относительно риска возникновения пневмонии и осложнений выявлен у гена арил гидрокарбон гидролазы *CYP1A1* и у одного из генов семейства глутатион-трансфераз — *GSTM1*. С одной стороны, мажорный аллель 606T/T гена *CYP1A1* ассоциирован с повышенным риском возникновения как острой внебольничной пневмонии (табл. 1), так и с развитием осложнений при ней. С другой стороны, гетерозиготный вариант данного аллеля 606T/G продемонстрировал протективный эффект при пневмонии различного генеза, особенно в случаях сочетания с делеционным вариантом гена *GSTM1D/D* ($p < 0,01$). Возможный механизм протективного действия делеционного аллеля *GSTM1* связан с гипотетической избыточностью активности ферментов

глутатионного пула. Это косвенно подтверждается высокой частотой делеционного полиморфизма *GSTM1*, а также частичной перекрестной субстратной специфичностью некоторых глутатион-S трансфераз (*GSTM*, *GSTP* и *GSTT*) [12, 13]. В свою очередь, высокая активность фермента первой фазы — *CYP1A1*, может рассматриваться как дестабилизирующий фактор процесса детоксикации ксенобиотиков. Rotunno M. с соавт. (2009) и Wang K. с соавт. (2010) в исследованиях по изучению рака легких также отмечали различие эффектов функционального полиморфизма гена *CYP1A1* [14, 15].

Гены второй стадии детоксикации ксенобиотиков — *GSTM1* и *GSTP1* (отдельно), ассоциированы с предрасположенностью к возникновению пневмонии и развитию осложнений: ген *GSTM1* — в случаях внебольничной пневмонии, а ген *GSTP1* — нозокомиальной (табл. 2). В результате проведенного исследования мы не получили статистически достоверных данных о сопряженности определенного генотипа с конкретным видом осложнений.

Третий локус, по которому было выявлено ассоциирование с высоким риском возникновения внебольничной пневмонии, — *ACE*. Ряд исследователей связывают наличие или отсутствие 287 п. о. элементов повторения *Alu* в этом гене с уровнями циркулирующих ферментов и изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы, но характер этих взаимоотношений пока не определен [16–19]. В исследованиях, проведенных Godschalk R. W. с соавт. (2001); Habbous M. с соавт. (2004) было отмечено, что гомозиготы по делеции гена *ACE* D/D ассоциированы с риском развития ПОН [20, 21]. В когортных исследованиях по изучению ОРДС у новорожденных показано, что одним из факторов риска развития дистресс-синдрома является генетическая предрасположенность [22–27], а именно, участие генов цитокиновой сети и *ACE* в формировании дыхательных расстройств [28]. В ходе проведенного нами исследования мы не получили статистически достоверных данных о сопряженности полиморфизма по изученным генам на риск развития ПОН, ОРДС или сепсиса (отдельно) в обследованной популяции больных. Но установили, что благоприятный исход при развитии

вышеперечисленных осложнений достоверно выше ($p < 0,01$) у тех, кто имеет аллельные варианты I/I, I/D гена *ACE*. Похожие результаты были отмечены в исследовании De Mesa R. L. (2002) [29].

Знание генотипа по кандидатным локусам важно для выявления групп наличия/отсутствия риска по изученным когортам: внебольничные пневмонии, нозокомиальные пневмонии и осложнения при них. Важно подчеркнуть, что само наличие неблагоприятного аллеля не позволяет судить ни о времени начала заболевания, ни о его тяжести. Нельзя также утверждать, что обследуемый наверняка заболеет именно этой болезнью. Генетическое тестирование в досимптоматический период дает возможность выявить существующие пока только в геноме наследственные тенденции к развитию будущих болезней и, исходя из современного врачебного опыта, наметить пути их ранней профилактики.

Выявление группы риска по развитию пневмонии дало ощутимые результаты, что проявилось в снижении частоты развития осложнений. Госпитализация больных внебольничной пневмонией на ранних сроках болезни (что было осуществлено для заболевших из группы К-ВП) позволило минимизировать развитие осложнений, ни одному пациенту из группы К-ВП не проводили ИВЛ, длительность госпитализации сократилась почти в два раза (с $35,53 \pm 14,21$ до $16,1 \pm 4,4$ суток), не было ни одного случая летального исхода.

Заключение

В результате проведенного исследования выявлена взаимосвязь полиморфизма генов первой и второй фаз детоксикации ксенобиотиков (*CYP1A1*, *GSTM1*) и гена *ACE* с предрасположенностью к развитию внебольничной пневмонии и ее осложнений, а гена *GSTP1* — с риском возникновения нозокомиальной пневмонии. Аллельные варианты этих генов детерминируют риск развития пневмонии различного генеза в связи с изменением активности кодируемых ими ферментов. Так же были выявлены генотипы и их сочетания протективной направленности (*CYP1A1* 606G/*, *GSTM1* D/D) относительно риска возникновения пневмонии.

Литература

1. Генетика бронхолегочных заболеваний. Пузырев В. П., Огородова Л. М. (ред.). М.: Атмосфера; 2010.
2. Сеитова Г. Н., Буйкин С. В., Рудко А. А., Фрейдин М. Б. Наследственность и болезни легких (Наследственность и здоровье), Учебное пособие. Пузырев В. П. (ред.). Томск: Печатная мануфактура; 2008.
3. Lockwood W. W., Chari R., Chi B., Lam W. L. Recent advances in array comparative genomic hybridization technologies and their applications in human genetics. Eur. J. Hum. Genet. 2006; 14 (2): 139–148.
4. Pugin J., Auckenthaler R., Mili N. et al. Diagnosis of ventilator-associated pneumonia by bacteriological analysis of bronchoscopic and non bronchoscopic «blind» bronchoalveolar lavage fluid. Am. Rev. Respir. Dis. 1991; 143 (5Pt 1): 1121–1129.
5. Сальникова Л. Е., Фомин Д. К., Елисова Т. В. и соавт. Изучение связи цитогенетических и эпидемиологических показателей с генотипами у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Радиационная биология. Радиология 2008; 48 (3): 303–312.
6. Электронная ссылка программы Primer3 [http://frodo.wi.mit.edu/primer3/].
7. Электронная ссылка (трендовый тест Армитажа) [http://www.biomedcentral.com/1753-6561/3/S7/S37].
8. Электронная ссылка on-line программы SNPStats [http://bioinfo.iconcologia.net].
9. Сальникова Л. Е., Смелая Т. В., Мороз В. В. и соавт. Генетическая предрасположенность к развитию острой внебольничной пневмонии. Общая реаниматология 2010; VI (1): 5–11.
10. Баранов В. С., Баранова Е. В., Иващенко Т. Э., Асеев М. В. Геном человека и гены «предрасположенности». Введение в предиктивную медицину. СПб.: Интермедика; 2000.
11. Ivashchenko T., Sideleva O., Baranov V. Glutathione-S-transferase micro and theta gene polymorphisms as new risk factors of atopic bronchial asthma. J. Mol. Med. 2002; 80 (1): 39–43.
12. Kirsch-Volders M., Mateuca R. A., Roelants M. et al. The effects of *GSTM1* and *GSTT1* polymorphisms on micronucleus frequencies in human lymphocytes in vivo. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2006; 15 (5): 1038–1042.
13. Сальникова Л. Е., Иванова Т. И., Кондрашова Т. В. и соавт. *GSTM1*: иметь или не иметь? Технологии живых систем 2009; 2: 31–38.
14. Rotunno M., Yu K., Lubin J. H. et al. Phase I metabolic genes and risk of lung cancer: multiple polymorphisms and mRNA expression. PLoS One 2009; 4 (5): e5652.

15. Wang K., Baldassano R., Zhang H. *et al.* Comparative genetic analysis of inflammatory bowel disease and type 1 diabetes implicates multiple loci with opposite effects. *Hum. Mol. Genet.* 2010; 19 (10): 2059–2067.
16. Casas J. P., Hingorani A. D., Bautista L. E., Sharma P. Meta-analysis of genetic studies in ischemic stroke: thirty-two genes involving approximately 18,000 cases and 58,000 controls. *Arch. Neurol.* 2004; 61 (11): 1652–1661.
17. Wakahara S., Konoshita T., Mizuno S. *et al.* Synergistic expression of angiotensin-converting enzyme (ACE) and ACE2 in human renal tissue and confounding effects of hypertension on the ACE to ACE2 ratio. *Endocrinology* 2007; 148 (5): 2453–2457.
18. Payne J. R., Dhamrait S. S., Gohlke P. *et al.* The impact of ACE genotype on serum ACE activity in a black South African male population. *Ann. Hum. Genet.* 2007; 71 (Pt 1): 1–7.
19. Han T. Y., Li Z. L., Ye H. M. Relationship of the disease severity with ACE gene polymorphism and serum ACE activity in preterm infants. *Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi* 2008; 10 (6): 693–696.
20. Godschalk R. W., Ostertag J. U., Zandsteeg A. M. Impact of GSTM1 on aromatic-DNA adducts and P53 accumulation in human skin and lymphocytes. *Pharmacogenetics* 2001; 11 (6): 537–543.
21. Haddous M., Herbeth B., Haddy N. *et al.* Smoking, genetic polymorphisms of glutathione S-transferases and biological indices of inflammation and cellular adhesion in the STANISLAS study. *EXCLI J.* 2004; 3: 58–67.
22. Haataja R., Marttila R., Uimari P. *et al.* Respiratory distress syndrome: evaluation of genetic susceptibility and protection by transmission disequilibrium test. *Hum. Genet.* 2001; 109 (3): 351–355.
23. Makri V., Hospes B., Stoll-Becker S. *et al.* Polymorphisms of surfactant protein B encoding gene: modifiers of the course of neonatal respiratory distress syndrome? *Eur. J. Pediatr.* 2002; 161 (11): 604–608.
24. van Sonderen L., Halsema E. F., Spiering E. J., Koppe J. G. Genetic influences in respiratory distress syndrome: a twin study. *Semin. Perinatol.* 2002; 26 (6): 447–449.
25. Marttila R., Haataja R., Rämetsä M. *et al.* Surfactant protein B polymorphism and respiratory distress syndrome in premature twins. *Hum. Genet.* 2003; 112 (1): 18–23.
26. Floras J. Sleep apnea in heart failure: implications of sympathetic nervous system activation for disease progression and treatment. *Curr. Heart Fail Rep.* 2005; 2 (4): 212–217.
27. Аульченко Ю. С., Аксенович Т. И. Методические подходы и стратегии картирования генов, контролирующих комплексные признаки человека. *Информ. вестн. ВОГиС* 2006; 10 (1): 189–202.
28. Бозданова П. З., Фатыхова А. И., Данилко К. В. и соавт. Генетические маркеры дыхательных расстройств у новорожденных. *Вопросы практич. педиатрии* 2008; 3 (6): 12–16.
29. de Mesa R. L., Sierrasesúmagu L., de Cerain A. L. *et al.* Pediatric meningioma: clinical evolution and genetic instability. *Pediatr. Neurol.* 2005; 32 (5): 352–354.

Поступила 18.02.11

Календарь ключевых международных мероприятий по анестезиологии-реаниматологии в 2011 г.

<p>11–15 апреля 2011 г.
NWAC World Anesthesia Congress 2011.
Rome, Italy
www.worldanesthesia.com</p> <p>29 апреля — 4 мая 2011 г.
33rd Annual Meeting and Workshops Society of Cardiovascular Anesthesiologists.
Savannah, GA
www.scahq.org</p> <p>5–8 мая 2011 г.
American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)
36th Annual Regional Anesthesia Meeting and Workshops 2011.
Las Vegas, United States
E-mail: asra@asahq.org
11–15 мая 2011 г.
58th Annual Meeting Association of University Anesthesiologists.
Philadelphia, PA
E-mail: dionne@asahq.org</p> | <p>11–14 июня 2011 г.
Euroanesthesia 2011.
Amsterdam, Netherlands
www.euroanesthesia.org</p> <p>3–6 сентября 2011 г.
33th Congress of Clinical Nutrition and Metabolism.
Göteborg, Sweden
www.espen.org</p> <p>14–17 сентября 2011 г.
European Burns Association Congress 2011.
The Hague, Netherlands
E-Mail: r.zikkenheimer@congresscare.com</p> <p>1–5 октября 2011 г.
24th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress.
Berlin, Germany. www.esicm.org</p> <p>15–19 октября 2011 г.
American Society of Anesthesiologists Annual Meeting. Chicago, IL. www.ASAhq.org</p> |
|---|---|